

Felhasználható

- ▶ Alternária
- ▶ Fitoftóra
- ▶ Peronoszpóra
- ▶ Varasodás
- ▶ Monília

Polyram® DF

Általános adatok

Hatóanyag ▶	70% metiram	Méregjelzés ▶	Gyakorlatilag nem mérgező
Hatóanyagcsoport ▶	Ditiokarbamát	Toxicitás ▶	Méhekre mérsékelten veszélyes Vízi szervezetekre közepesen veszélyes
Forgalmazási kategória ▶	III.	Tűzveszélyesség ▶	Tűzveszélyes
Engedély száma ▶	12248/1993	Munkaegészségügyi várakozási idő ▶	0 nap
Formuláció ▶	Vízben oldható granulátum	Elsősegélynyújtás ▶	Ditiokarbamát-mérgezés
Kiszerezés ▶	1 kg, 25 kg	Egyéb információ ▶	Sárga ☹, IPM ○
Eltarthatóság ▶	2 év		

Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Dózis	É.v.i. (nap)	Kultúra fejlődési stádiuma
Paprika, paradicsom	Alternária, fitoftóra	2,0 kg/ha	7	Preventíven, a fertőzés előtt
Burgonya	Alternária, fitoftóra	1,5–1,8 kg/ha	21	Preventíven, a fertőzés előtt
Kalászosok (őszi)	Gombabetegségek (kivéve lisztharmat)	2,0 kg/ha	52	Preventíven, a fertőzés előtt
Szója, lencse	Gombabetegségek (kivéve lisztharmat)	1,2–1,6 kg/ha	21	Preventíven, a fertőzés előtt
Komló	Gombabetegségek (kivéve lisztharmat)	2,5 kg/ha	14	Preventíven, a fertőzés előtt

Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Dózis	É.v.i. (nap)	Kultúra fejlődési stádiuma
Szőlő	Peronoszpóra	2,0–2,5 kg/ha	30	Preventíven, 4-6 leveles állapottól
Almatermésűek	Varasodás, monília	2,0–2,5 kg/ha	30	Zöldbimbós állapottól gyümölcsérésig
Dísznövények	Alternária	1,6 kg/ha	–	Preventíven, a fertőzés előtt

Felhasználási javaslatunk

Hatás / hatásspektrum ▶	Kontakt hatású; belső élősködő gombák (peronoszporafélék, foltbetegségek stb.) ellen hatékony.
Hatáskifejtés ▶	Több ponton gátolja a gombák életfolyamatait.
Kijuttatási idő ▶	Preventíven, a fertőzési folyamat kezdetén.
Permetlé vízmennyisége ▶	400–800 l/ha, légi úton 70–90 l/ha.
Permetléporlasztás ▶	Finomcseppes kijuttatás.
Ideális hőmérséklet ▶	Nem befolyásoló tényező.
Ideális időszak ▶	Nem befolyásoló tényező.
Hatásnövelő körülmények ▶	Nincs.
Kombinálhatóság ▶	Szőlőben a gombaölő szerek közül Discus DF-fel, Flamencóval, Kumulus S-sel, a rovarölő szerek közül Fendona 10 EC, Nomolt 15 SC, Cascade 5 EC, Torque 50 WP, Bi 58 EC készítményekkel kombinálható.
Felhasználás gyakorisága ▶	Szőlőben 10-14 naponként. Almatermésűekben 7-14 naponként.
Védőfelszerelések ▶	Elkészítő (E), felhasználó, kijuttató (F): munkaruha, védőkalap, -kesztyű, -lábbeli.
Megjegyzés ▶	Kedvező esőállóságú és tapadóképességű. Cinktartalmát a növény tápelemként hasznosítja, édesebb és színesebb lesz a gyümölcs. Integrált termesztési rendszerben évente legfeljebb négyszer használható.