


# Tanos<sup>®</sup> 50 DF szőlőben

Különleges tulajdonsággal rendelkező, kombinált hatóanyagú gombaölő szer szőlőperonoszpóra ellen.


Tanos <sup>®</sup> 50 DF szőlő	
Hatóanyag	25% cimoxanil + 25% famoxadon
Formuláció	vízben oldható granulátum (DF)
Hatóanyag mozgása a kezelt növényben	kontakt és helyileg felszívódó
Forgalmi kategória	II.
Csomagolás	0,4 kg-os műanyag doboz
Károsító	szőlőperonoszpóra
Dózis	0,4 kg/ha
Méregjelzés	p.o.LD50 patkányon: ☞ 1311 mg/kg
Kijuttatás időzítése	a fertőzés veszélyes időszakban megelőző jelleggel kell kijuttatni
	a vegetáció kezdeti időszakában
	7-12 napos permetezési fordulóval
Kombinációs partner	lisztharmatfertőzés esetén Talendo <sup>®</sup> + Tanos <sup>®</sup> 0,2 l/ha + 0,4 kg /ha, nekeverje a Tanos <sup>®</sup> -t lúgos kémhatású készítményekkel
Nedvesítőszer adagolása	-
Javasolt permetlé mennyisége	800-1000 l/ha
Esőállóság	a kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását
Kezelések minimális és maximális száma	1-3
Légi kijuttatás	-
Maximális összes dózis	1,2 kg/ha
Két kezelés közt eltelt minimális időtartam (nap)	14
Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)	fürtzáródás idején
Korlátozások	25 °C felett ne permetezzen a készítménnyel
	a bekevert permetlevet nem szabad állni hagyni, mert a hatóanyag a bekevert permetlében bizonyos idő után gyorsan lebomlik

A Tanos<sup>®</sup> a DuPont kutatás egyik gombaölő szere, amely két rendkívül hatékony molekulát tartalmaz. A két hatóanyag hatásmechanizmusában, módjában és tartamában tökéletesen kiegészíti és erősíti egymást. Az erős enzimgátlás miatt már alacsony dózisban (0,4 kg/ha, 1000 l permetlé) hatásos.

A DuPont technológiával kezelt szőlő egészséges, Bata, 2008.



A DuPont technológia eredménye az szép termés, Nagyréde, 2009.




# Tanos® 50 DF

A Tanos® két hatóanyag komplett egysége, így: hosszú preventív hatás mellett rendelkezik kuratív és eradikatív hatással is, elpusztítja a zoospórákat (*famoxadon*), meggátolja a spóra kibocsátást (*cimoxanil*),

azonnali stop hatással bír (*cimoxanil*), a levélfelületen újraaktiválódik (*famoxadon*), egyedülálló esőállósággal rendelkezik, kiváló sérülésgyógyító hatású.

A Tanos® nagyobb felületen egészségesen tartotta a levelet, mint amit közvetlenül ért a permet csepp. Ez bizonyítja a hatóanyag relatív mozgását a levél viaszrétegében.



## Hogyan használjuk? Mire törekedjünk a permetezések során?

**Időzítés:** megelőzés – (prevenció)  
**Koncentráció:** 0,4 kg/1000 l/ha vízben

**Fedettség:** törekedjünk a tökéletes fedettségre  
**Permetezési forduló:** 10-14 nap a fertőzési nyomástól függően.